

החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות



האתר הרשמי של החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות

אודות החברה הודעות החברה מצגות וכנסים הצטרפות לחברה עיתון התמכרויות בישראל קישורים

מאמר זה התפרסם באתר דוקטורס אונלי <https://doctorsonly.co.il>

חדשות

עלייה במספר בני נוער וצעירים המכורים לקנאביס בישראל

מעל 15 אלף ישראלים טופלו השנה עקב התמכרות לסמים ולאalkohol | שיעור המשתמשים בקנאביס הוא הגדול ביותר בקרב צעירים - 63% מהמתמכרים

מערכת דוקטורס אונלי 31.12.2019, 08:17



צעירה מעשנת קנאביס. אילוסטרציה

15,067 בני אדם – 11,850 גברים ו-3,217 נשים – טופלו בשנת 2018 בישראל בהתמכרויות לסמים ואלכוהול, זאת בהשוואה לשנת 2017 שבה טופלו 14,826. כך נמסר אתמול (ב') לרגל חודש המאבק בסמים ואלכוהול וערב השנה האזרחית החדשה.

עוד בעניין דומה

השלכות של חשיפה לקנאביס בסמוך ללידה

תשומת לב מיוחדת בסמוך לניתוחים למשתמשי קנאביס: סקירה מקיפה של השיקולים הנוגעים לשימוש בתרופות וחומרי הרדמה

ההשפעה של צריכת קנאביס לפני מגע מיני על התפקוד המיני בנשים

הנתונים פורסמו על ידי משרד העבודה והרווחה והם הגיעו לידינו מכ-240 מסגרות טיפוליות למבוגרים ונוער בקהילה וגם במרכזי טיפול נוספים.

ההתמכרויות השכיחות ביותר הן: לאלכוהול, לקנאביס (חשיש) ולאופיאטים - הרואין ומורפיום, קוקאין ו"סמי פיצוציות".

בנוסף טופלו 600 ישראלים שהתמכרו להימורים, לקניות ולסמים (22 מטופלים), למין ולסמים (22 מטופלים), לאינטרנט ולסמים (16 מטופלים). בטיפול שהם מקבלים מרצונם נעשה שימוש בשיטה קוגניטיבית-התנהגותית או דינמית שנועדה לסייע למכורים להתגבר על קשייהם ולנהל אורח חיים תקין. כמו כן ניתן טיפול במכורים לסמי הזיה, לתרופות מרשם ולממריצים.

17% מהמטופלים סיימו את הטיפול בהצלחה ומנהלים עתה אורח חיים עצמאי ללא שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והתמכרות התנהגותית. 30% נשרו מהטיפול ו-53% ממשיכים בו. 5% הם דרי רחוב וחסרי עורף משפחתי.

עוד נמסר כי 3,544 בני נוער מתחת לגיל 18 טופלו במסגרות לטיפול בהתמכרויות, עלייה של 7% לעומת 2017 (3,711). 67% מהם כתוצאה משימוש לרעה בקנאביס ובכמות חומרים משתנה כמה פעמים בשבוע. הם מציגים עקב כך קשיי תפקוד.

בקרב בני 18-25 טופלו 2,344. שיעור המשתמשים בקנאביס הוא הגדול ביותר - 63% מהמתמכרים. בקבוצת הגיל של מעל 26 ההתמכרות השכיחה ביותר היא אלכוהול. בגילאי 26-40 שיעור המכורים לאלכוהול בקרב המטופלים עמד על 30% לעומת 27% לקנאביס. בקבוצת הגיל של בני 41 ומעלה שיעור המטופלים המכורים לקנאביס הוא 10% בלבד ו-40% טופלו כתוצאה מהתמכרות לאלכוהול. 25% מקבוצת המטופלים בגיל זה טופלו כתוצאה מהתמכרות לאופיאידים.

35% מהמטופלים נמצאים במחוז חיפה והצפון, 32% במחוז תל אביב והמרכז, 24% במחוז ירושלים ו-9% במחוז דרום.


הירשמו לקבלת עדכונים בנושאים שעלו בכתבה < 

מחקרים

האם שימוש בקנאביס מעודד תגובה נוגדת דלקת?

במחקר זה נעשה שימוש במחקר אורך גדול בתחום הבריאות של מבוגרים ומתבגרים, בכדי להבין האם יש קשר בין שימוש בקנאביס בתקופה האחרונה לבין השראת תגובה נוגדת דלקת, בעזרת מדידת רמות CRP בדמם של המשתתפים

16:20 ,17.11.2019 Drug and Alcohol Dependence



כמה מחקרים מצביעים על כך ששימוש בקנאביס מביא לתגובה נוגדת דלקת, אך ההבנה של יחסי הגומלין שבין שימוש במקנאביס לבין דלקת, כפי שנמדדת על ידי החלבון המגיב-C(CRP), עודנה דלה. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את הקשר שבין שימוש לאחרונה בקנאביס לבין רמות CRP בקרב מדגם לאומי מייצג של מבוגרים.

עוד בעניין דומה

מה הקשר בין תדירות השימוש בקנאביס לבין איכות החיים של משתמשים קבועים?

ה-FDA מזהיר: על נשים הרות ומיניקות להימנע מצריכת כל צורה של קנאביס

רמות CRP מוגברות אצל נשים הסובלות מפירומיאלגיה ותסמונת עייפות כרונית

מחקר זה עשה שימוש בנתונים מפעילות 3 ו-4 (13,166 משתתפים) של מחקר האורך הלאומי בנושא בריאות של מבוגרים ומתבגרים (National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health). שימוש בקנאביס ב-30 הימים האחרונים תועד בפעילות 3 ו-4, ושימוש בשנה האחרונה תועד גם בשלב 4. ערכי CRP פוצלו לשניים, עם ערך סף של 3 מיליגרם/ליטר. ניתוחי רגרסיה לוגיסטית בחנו את הקשר שבין שימוש בקנאביס לבין רמות CRP בפעילה 4 של המחקר.

שימוש בקנאביס ב-30 הימים האחרונים דווח על ידי 23.5%-ו-17.7% מהמשתתפים בפעילות 3 ו-4, בהתאמה. 23.6% משתתפים דיווחו על שימוש בקנאביס בשנה האחרונה בפעילה 4. שימוש בקנאביס היה קשור לרמות CRP נמוכות יותר בניתוחים דו-משתניים. אולם, קשרים אלה נחלשו לאחר התאמה למשתנים נלווים הקשורים לבריאות ולמאפיינים חברתיים-דמוגרפיים.

החוקרים הסיקו שלמרות שתחילה נמצא קשר בין קנאביס לבין רמות CRP נמוכות יותר, השפעת קנאביס על CRP הוסברה לאחר מכן על ידי מגדר, מדד מסת גוף, ושימוש בתרופות נוגדות דלקת. ממצאים אלה מצביעים על כך ששימוש בקנאביס לא מביא להשפעה נוגדת דלקת, והזמן שחלף מאז השימוש איננו רלוונטי. לאור החוקיות המתרחבת של שימוש בקנאביס והמחלוקות בנוגע להשלכות של שימוש בקנאביס על הבריאות, מחקרי המשך נדרשים בכדי להבהיר את ההשפעה של קנאביס על דלקת ועל הסיכון העוקב למחלה כרונית.

מקור:

Ferguson EG, Mannes, ZL, Ennis, N. (2019). *Drug and Alcohol Dependence*. 198:162-167

מחקרים

האם שימוש בקנאביס מסיבות רפואיות בלבד שונה מצריכתו מסיבות אחרות?

במחקר זה נותחו נתונים לגבי הרגלי צריכת הקנאביס של עשרות אלפי אנשים, בכדי לנסות ולאפיין את המשתמשים בקנאביס מסיבות רפואיות בלבד, מסיבות אחרות, או משילוב של סיבות רפואיות עם סיבות אחרות

14:53 ,15.10.2019 [Drug and Alcohol Dependence](#)



עישון קנאביס (אילוסטרציה)

מטרתו של מחקר זה הייתה לאפיין משתמשי קנאביס מסיבות רפואיות ומסיבות אחרות, מבחינת גורמים חברתיים-דמוגרפיים, המצבים הרפואיים שלהם והתחלואות הנפשיות הנלוות.

עוד בעניין דומה

מחלת המאייזים בארה"ב ממשיכה לגבות מחיר כבד: מספר החולים עלה ל-1,299

מדוע מטופלים הנוטלים אופיאטים פונים לשימוש בקנאביס?

האם קנאביס אכן מסייע לחולי אפילפסיה באיזון הפרוסים?

המחקר עשה שימוש בנתונים של 36,309 מבוגרים בני 18 ומעלה שנאספו בסקר לאומי שבוצע בארצות הברית בשנים 2012-2013, בנושא צריכת אלכוהול ומצבים נלווים (National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions III).

בהשוואה לאנשים שהשתמשו בקנאביס מסיבות שאינן רפואיות בלבד (3,339 משתתפים), אנשים שהשתמשו בקנאביס רק מסיבות רפואיות (82 משתתפים) או משילוב של סיבות (362 משתתפים) התאפיינו בשכיחות גבוהה יותר של כל המצבים הרפואיים שנבדקו בסקר. בהשוואה לקבוצת האנשים שהשתמשו בקנאביס מסיבות משולבות, אלה שצרכו קנאביס מסיבות רפואיות בלבד היו בעלי סבירות נמוכה יותר משמעותית לסבול מחרדה, ומהפרעות שימוש באלכוהול או באופיאטים שלא ניתנו תחת מרשם רפואי.

החוקרים הסיקו שמסתמן כי אנשים המשתמשים בקנאביס מסיבות רפואיות בלבד עושים זאת על סמך רפואה מבוססת-ראיות, וניתן למצוא אצלם שכיחות נמוכה יותר של הפרעות שימוש בחומרים

ביחס למשתמשי קנאביס אחרים. עם זאת, מכיוון שמרבית המשתמשים מסיבות רפואיות נוהגים להשתמש בקנאביס גם מסיבות אחרות, יש ליישם סקירה של המטופלים להפרעות נפשיות ומאמצים למניעת הפרעת שימוש בקנאביס, כחלק מאישור השימוש בקנאביס רפואי.

מקור:

Wall, MM. *et al.* (2019). *Drug and Alcohol Dependence*. 195:13-15